Qu'est-ce que la maladie de Lyme et la MEVE?

Chaque année, env. 25'400' patients consultent leur **médecin** à cause d'une **morsure de tique**, car cela peut entraîner des maladies graves.

Les principales maladies transmises par les tiques sont la maladie de Lyme et la MEVE. Elles diffèrent ainsi:

	Maladie de Lyme (borréliose)	MEVE (méningo-encéphalite verno-estivale)
Nombre de cas en 2020	env. 15′500¹	env. 435¹
Symptômes	 Rougeur cutanée circulaire (dans env. 50 % des cas seulement)³ Symptômes pseudo-grippaux Maux de tête, etc. 	 Symptômes pseudo-grippaux Fièvre Maux de tête, etc.
Conséquences possibles	 Inflammations articulaires Lésions d'organes Invalidité, etc. 	 Méningite et méningo-encéphalite Paralysies Décès dans de rares cas
Prophylaxie/ Vaccin	 Vaccin pas possible Protection grâce aux mesures de prévention par ex. en utilisant un répulsif anti-tiques 	 Vaccin possible Protection grâce aux mesures de prévention par ex. en utilisant un répulsif anti-tiques

Aperçu de la gamme ANTI-BRUMM®

		Protection	Age/Application
	ANTI-BRUMM® Anti-Tiques	• Contre les tiques: 8 h	 À partir de 1 an Renouveler l'application jusqu'à 3 x / jour
	ANTI-RUMM® Forte	• Contre les moustiques: 6h • Contre les tiques: 5 h	 À partir de 2 ans Appliquer jusqu'à 2 x/jour Renouveler l'application après le bain ou en cas de transpiration abondante
	ANTI-BRUMM® Kids	• Contre les moustiques: 8 h • Contre les tiques: 5 h	Dès 1 an Jusqu'à 2 x / jour Renouveler l'application après le bain ou en cas de transpiration abondante
	ANTI-BRUMM® Naturel	• Contre les moustiques: 6h • Contre les tiques: 5h	 À partir de 1 an Appliquer plusieurs fois par jour Renouveler l'application après le bain ou en cas de transpiration abondante
	ANTI-BRUMM® Night	Contre les moustiques: 8 h (toute la nuit) Avec dexpanthenol hydratant	À partir de 1 an Appliquer une couche homogène partout sur la peau avant de se coucher
70	ANTI-BRUMM® SUN 2en1 SPF 50/30	Contre les moustiques indigènes: 5 h Contre les moustiques tropicaux: 2 h Contre les tiques: 4 h Protection solaire SPF 50/30	 À partir de 1 an Appliquer régulièrement Pour le visage et le corps Résistant à l'eau







Pourquoi faut-il se protéger contre les tiques

- ✓ Les tiques peuvent transmettre des maladies graves
- ✓ En raison de leurs **symptômes peu spécifiques**, ces maladies sont difficiles à diagnostiquer et peuvent provoquer des **séquelles à long terme**
- ✓ Chaque année, les zones à risque s'étendent


Risque de piqûres de tique²

En Suisse, **5 à 30%** des tiques (**jusqu'à 50%** par endroits) sont **porteuses de borrélies** et env. **0.5% sont porteuses du virus de la MEVE.**³

En raison de l'évolution de la situation épidémiologique due à l'augmentation des maladies à MEVE (méningo-encéphalite verno-estivale) ces dernières années, **l'ensemble de la Suisse** est désormais considérée comme une **zone à risque,** à l'exception des cantons de Genève et du Tessin.⁴

Le risque de contracter une **borréliose de Lyme** existe **partout** où le risque de piqûre de tique est présent.⁵

Cette carte montre les régions de probabilité moyenne à élevée (en orange) ou plus faible (en bleu) d'être piqué par une tique en Suisse. Pour la carte détaillée «Modèle de piqûres de tique» de l'OFSP, voir: map.geo.admin.ch.²



Se protéger des tiques



Utiliser un répulsif anti-tiques efficace

ANTI-BRUMM® Anti-Tiques

- ✓ protège contre les tiques jusqu'à 8 h
- ✓ aux enfants dès 1 an
- ✓ peut être appliqué sur la peau et les textiles
- ✓ très bonne tolérance cutanée.

Utilisation particulièrement recommandée en cas d'activités en forêt et dans l'herbe haute (par ex. jogging/marche, jeux en forêt, etc.)




Vaccination contre la MEVE (ne protège pas contre la borréliose de Lyme ni contre d'autres maladies transmises par les tiques)



Porter des vêtements couvrant bien le corps



Examiner systématiquement le corps à la recherche de tiques après une sortie dans la nature. Les tiques privilégient les parties du corps où la peau est chaude, humide et fine, telles que:



Retirer la tique

Faire glisser la carte sur la peau et immobiliser la tique latéralement dans l'entaille de la carte.



Sans interrompre le mouvement, retirer la tique du corps en soulevant la carte.



Eliminer la tique. Surveiller le site de la piqûre: penser à une borréliose, surtout si une rougeur cutanée apparaît et qu'elle grandit consulter un médecin!



Il reste une ou des parties de tique dans la peau? **Pas de panique!** Ces restes seront expulsés par le corps.



En cas d'incertitude, veuillez consulter votre pharmacie, votre droguerie ou votre médecin.

De plus amples informations sur:



Application «Tique»

Télécharger gratuitement dans l'App Store et sur Google play ⁶





piqure-de-tique.ch





zeckenliga.ch





antibrumm.ch

